

**Avertissement:** Notes prises au vol, erreurs possibles, prudence...

Mardi 7 avril 2015

Hôpital cantonal de Genève

## Le nouveau guide des Antibiotiques: concepts clés

Dr B. Huttner

Un colloque destiné aux hospitaliers...Il s'agit de la présentation du nouveau «Guide des Antibiotiques» des HUGs...Cette année, à l'instar du CHUV, il y a de la couleur... et même des «Angry bugs»...qui indiquent à l'interne s'il peut, s'il doit, ou s'il est impératif de consulter un infectiologue avant de traiter...par exemple...avant l'utilisation d'antifongiques, lors d'endocardite infectieuse, etc...



Un des objectifs, en dehors d'améliorer les traitements pour le patient, est celui d'éviter la propagation de résistances comme celle aux beta-lactames (BLSE) et celle au Carbapenem. Un autre objectif serait de diminuer les coûts...

La plupart des recommandations cependant ne sont pas basées sur des études randomisées (niveau de preuve 1).

On nous rappelle qu'il y a des guidelines suisses établies par la «swiss society for infectious disease» <http://sginf.ch/ssi-home/guidelines/ssi.html> pour l'infection urinaire, la pneumonie acquise en communauté, la borrelie...pour les maladies sexuellement transmise il y a celles de l'OFSP: (<file:///Users/ericbierensdehaan/Downloads/Recommandations-pour-le-traitement-des-IST.pdf>)

Idem pour la varicelle (swiss herpes management forum 2007).

On nous souligne l'importance pour certains antibiotiques, comme la Colistine, de la dose de charge qui permet d'atteindre un taux sérique en quelques heures, alors que sans cette dernière il faut attendre 48 hres avant d'être dans une zone thérapeutique.

Pour certains antibiotiques, comme les aminoglycosides, c'est la concentration maximale atteinte qui est importante, donc l'intérêt d'une administration intermittente, alors que pour d'autres c'est la constance d'un taux sérique au dessus de la CMI (concentration minimale inhibitrice) qui prime, par exemple pour les bêta-lactames.

En ce qui concerne la médecine ambulatoire ...un mot sur l'administration per os de Co-Amoxiclav 2x1g ou 3x 625mg...c'est à évaluer de cas en cas...pour ceux dont l'observance ne fait aucuns doutes...2x1g ça pourrait aller...mais chez les autres, 3x/j c'est préférable...car si une dose est oubliée...on espère qu'il y a au moins 2 doses qui sont prises...

Compte-rendu du Dr Eric Bierens de Haan  
[ericbdh@bluewin.ch](mailto:ericbdh@bluewin.ch)

transmis par le laboratoire MGD  
[colloque@labomgd.ch](mailto:colloque@labomgd.ch)